

Hydropus marginellus (Pers.:Fr.) Singer

Forêt de Levier, 08 2016, 28.08.2017

Chapeau jusqu'à 30 mm, brun, gris, luisant par temps humide, tantôt convexe, tantôt déprimé-ombiliquée, vaguement strié. Lames épaisses adnées, subdécurrentes, partiellement anastomosées, à marge parfois sombre. Pied concolore, lisse à l'œil nu. Odeur nulle.

Microscopie:

Cuticule hyméniforme avec des poils claviformes ou cylindriques, à pigment intracellulaire, de forme très variable. Basides tétrasporiques, quelque fois bisporiques. Cheilocystides nombreuses, cylindriques. Caulocystides claviformes à cylindriques. Laticifères nombreux.

Spores elliptiques, amyloïdes. (4.88)5.22-6.65-7.45(7.62) x (2.75)3.22-3.8-4.58(4.91)

Qm= 1.68

Habitat: sur souche ou débris de sapin blanc (*Abies alba*)

L'espèce est longuement décrite dans le remarquable ouvrage de R. Kühner : le Genre *Mycena*. Elle s'est appelée *Collybia ambusta* (Fr.), *Clitocybe umbrino-marginata*, *Omphalia rugosodisca*, *Mycena marginella*, ce qui montre bien les difficultés rencontrées pour délimiter le genre *Hydropus*.


Elle est signalée comme rare par Breitenbach et Kränzlin mais elle est probablement souvent méconnue.



Hydropus marginellus (Pers.:Fr.) Singer




Hydropus marginellus (Pers.:Fr.) Singer





N°28	Long.	Larg.	Q	V
Moy	6.39	3.84	1.68	50.9
Min	4.88	2.75	1.31	19.4
Max	7.62	4.91	2.07	84.7
Sigma	0.69	0.49	0.20	16.0
médiane	6.48	3.83	1.71	48.55





Hydropus marginellus (Pers.:Fr.) Singer



Cuticle



Cheilocystides



Caulocystides

Hydropus marginellus (Pers.:Fr.) Singer



Littérature:

Bresinsky (2008) Die Gattungen Hydropus bis Hysizygyus

Ludwig (2001) Pilzkompodium, vol.1

Kühner (1937) Le genre Mycena

Rivista di Micologia Anno XXXV N° 2