

Agaricus altipes (F.H. Møller) Pilat, Sborn
=**Agaricus aestivalis** (F.H. Møller) Pilat



Agaricus altipes (F.H. Møller) Pilat, Sborn
=**Agaricus aestivalis** (F.H. Møller) Pilat



Agaricus altipes (F.H. Møller) Pilat, Sborn
= **Agaricus aestivalis** (F.H. Møller) Pilat

Boujailles, 6 juin 2010

L'apparition précoce de cette belle espèce, la teinte blanche du chapeau, ce dernier orné par ailleurs de restes de voile, les dimensions sporiques orientent la détermination .

Luis Alberto Parra Sanchez (2008) synonymise les deux appellations: pour lui les nuances de couleur et d'odeur qui pourraient différencier les deux taxons entrent dans le cadre de variations intraspécifiques, ceci sur la base de l'étude durant trois ans de spécimens provenant du même mycélium

L'anneau est fugace, souvent absent, le pied est vaguement rosé au sommet, devenant à peine ocracé à la base. L'odeur est nulle à très vaguement anisée.

Réaction de Schaeffer négative.



Spores sans pore distinct.

5,6 [6,2 ; 6,9] 7,6 x 3 [3,6 ; 4,3] 4,9

Q = 1,3 [1,5 ; 1,8] 2,1 ; N = 8 ; C = 95%

Me = 6,57 x 3,95 ; Qe = 1,68

Bibliographie:

Luis Alberto Parra Sanchez (2008) Agaricus, Alassio