

Boletus rubrosanguineus (Walty) ex Cheype

20-06-2017.

Chapeau 9cm, Pied 9x5 cm.

Chapeau de teinte café au lait, mastic, noircissant au frottement. Tubes bleuissant à la pression.

Pores rouge vif, noircissant à la pression. La chair est jaune pâle, bleuissant à peine à la section.

Présence d'un réseau bien dessiné, sur le pied .Odeur nulle à vaguement fruitée.

Réaction à l'iode faible.



Remarques:

Ce Bolet fait partie de la section **LURIDI**, série **Satanas**, à cause de ses pores rouges, de la présence d'un réseau, et de la chair bleuissant à peine ou pas du tout. (Au contraire de ce qui se passe pour *B. rhodopurpureus*).

L'habitat est plutôt montagnard, sur sol calcaire, sous *Abies et Picea*.

La délimitation d'avec les autres taxons de la section LURIDI, série Satanus est délicate et a prêté souvent à confusion.

Littérature:

Lannoy-& Estades, Documents mycologiques vol.6

J.-A. Munos, Boletus s.l.

Boletus rubrosanguineus (Walty) ex Cheype



Chair rougissant sous la cuticule

Il y avait très peu de spores, probablement immatures, les dimensions données ici sont inférieures à celles signalées dans la littérature.

Notation : D1, Dominante, D9

Lxl: N= 20 ; dMd; (9.81)10.03-12.21-12.24(12.90) x (3.79)4.08-4.62-4.94(6.04)

Qm= 2.48

