

Cortinarius pseudocrassus P.D.Orton

C.pseudocrassus Joss. 1948 nom inval.

= **C. crassus** ss.auct.

Boujailles 2.8.2009, sous conifères

Ce taxon est classé par Bidaud, Moëgne-Loccoz, Reumaux dans le sous- genre **Phlegmacium**, section Phlegmacium sous section **Variipedes, série pseudocrassus**, que caractérisent l'absence de teinte violacée, la chair plus moins jaunissante, le stipe appointi à la base.

C rubicundulus (Rea) Pearson fait partie de la même série.

C. pseudocrassus est bien reconnaissable à ces cystides (pleuro et cheilo) réfringentes, lagéniformes. Je le trouve souvent en abondance dès le mois d'août , dans différentes stations, dans les forêts de Levier et Boujailles. (Doubs).

Dans la pars IX de l'Atlas des Cortinaires, Bidaud-Moëgne-Loccoz- et Reumaux en décrivent plusieurs variétés. Celle présentée ici est *C. pseudocrassus* var.*pseudocrassus*



Cortinarius pseudocrassus Joss. ex P.D.Orton




On notera le stipe terminé en pointe.



Cortinarius pseudocrassus Joss. ex P.D.Orton

Spores peu ornées, 6,8,5 x 4-4,5

Pleurocystides facilement repérables sauf chez les très vieux exemplaires



Pleurocystides fortement biréfringentes très nombreuses. Cheilocystides plus grêles.

