

Cortinarius rubicundulus (Real) Pears

22 08 2013, Boujailles, hêtraie-sapinière 800 m.



La couleur rouge brique du chapeau et le jaunissement intense de la chair à la coupe permettent d'identifier facilement cette espèce. Elle est relativement précoce et je la trouve souvent en troupe, même par temps sec, lorsque il n'y a pratiquement rien d'autre.



L'exemplaire figuré ici pourrait éventuellement être confondu avec *C. bolaris*, mais cette dernière espèce est couverte d'écailles rougeâtres, ses spores sont subglobuleuses et non ellipsoïdes.

Cortinarius rubicundulus (Real) Pears



Cortinarius rubicundulus (Real) Pears

Les auteurs de l'Atlas des Cortinaires classent *C. rubicundulus* dans les Phlegmacium, sous section Variipedes série pseudocrassus. Il se rapproche en effet de *C. pseudocrassus* par ses cystides en partie cylindriques et fusiformes. La ressemblance avec *C. bolaris* n'est que superficielle.




Bibliographie:

A. Bidaud- P. Moëne-Loccoz - P. Reumaux, Atlas des Cortinaires, Pars IX.

H. Henry, BSMF 51 (1935) p.330-333

Cortinarius rubicundulus (Real) Pears



Cheilocystides à contenu
jaune olivâtre

Les spores
sont
elliptiques,
fluettes
selon les
auteurs de

l'Atlas des Cortinaires, avec des verrues discrètes.
Dimensions des spores de notre récolte:

6,6 [7,6 ; 8,1] 9,1 x 3,3 [4 ; 4,3] 4,9 μm
Q = 1,5 [1,8 ; 2] 2,4 ; N = 20 ; C = 95%
Me = 7,9 x 4,1 μm ; Qe = 1,9

