

Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.



Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.



exemplaires du mardi

Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.

Boujailles, 29 08 2013, exemplaires récoltés à la lisière d'une pessière.

Description reprise de Marcel Bon (1990) :

Lames blanchâtres ou pâles.

*Couleurs moins sombres (que *H. capreolaris*), chapeau 5-10 cm à revêtement plus ou moins ponctué, au moins au disque, rosé vineux à lilacin.*

Stipe presque entièrement ponctué, subconcolore.

*Chair pâle plus ou moins jaunissante, saveur variable, (amère dans la variété *erubescens*)*

Spores 8-10^µ elliptiques.

Epicutis en ixo-trichoderme, à hyphes plus moins ramifiées à pigment intracellulaire ou mixte.

Caulocutis à poils raides palissadiques

Nos exemplaires sont caractérisés par un chapeau à la teinte plus rose que pourpre.

Le jaunissement du pied est assez net, la saveur est amarescente.

Le champignon est fidèle à la station où je le trouve régulièrement depuis quelques années.

Bon le range dans la section ***Rubentes*** Fries, caractérisant des espèces rosées ou tachées de purpurin, plus ou moins jaunissantes, à lames ponctuées de rosâtre à purpurin.


Apparition de pigment membranaire dans le subcutis.



Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.




Baside



Poils du sommet du pied

Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.



Spores

7,8 [9 ; 9,6] 10,8 x 4,5 [5,3 ; 5,7] 6,4 μm
Q = 1,4 [1,6 ; 1,8] 2 ; N = 25 ; C = 95%
Me = 9,3 x 5,5 μm ; Qe = 1,7