

# Leccinum piceinum Pilat et Dermek

Boujailles , (F25), 800 m. 29 septembre 2013



Durant plusieurs saisons d'affilées, ce beau champignon orangé m'a intrigué: avec son habitus de *Leccinum aurantiacum*, je le trouvais régulièrement dans une vieille pessière sans aucun feuillu ni pin à moins de 100m. Il ne pouvait donc s'agir ni de *L. aurantiacum* ni de *L. vulpinum*.

C'est finalement l'incontournable monographie de G.Lannoy et A. Estades qui m'a donné ce que je pense être la solution..

La couleur rouille orangé (de *Lactarius rufus* selon les auteurs précités), les pores blanchâtres, le pied blanc parsemé de squamules grisâtres et taché de vert à la base, l'épicutis formé d'hyphes cylindracées et l'habitat sous *Picea abies* sont les caractéristiques de l'espèce.

Bibliographie: G.Lannoy et A. Estades, Monographie des Leccinum d'Europe, La Roche sur Foron, 1995.

*Leccinum piceinum* Pilat et Dermek




*Leccinum piceinum* Pilat et Dermek



# Leccinum piceinum Pilat et Dermek



8,8 [12,7 ; 15] 18,9 x 1,9 [3,2 ; 4] 5,3  
Q = 2,6 [3,5 ; 4,1] 4,9 ; N = 18 ; C = 95%  
Me = 13,86 x 3,59 ; Qe = 3,78



Hypes de la cuticule

# Leccinum piceinum Pilat et Dermek



Verdississement du pied